



آلو کی منافع بخش پیداوار لکی کور انڈسٹریز کراپ مینجمنٹ پروگرام کے ساتھ



ایل سی آئی امانینو

ایل سی آئی امانینو، مائیکرو ایندز اور دیگر مائیکرو نیوٹریئنٹس پر مشتمل ایک منفرد فارمولا ہے۔ جو پودے کیلئے ایک مکمل نامیاتی غذا ہے اور پودے کی برہوتاری اور پیداواری مرحلے پر استعمال کیلئے یکساں مفید ہے۔ ایل سی آئی امانینو کے استعمال سے قوت مدافعت بڑھنے سے پودے غیر حیات ثانی دباؤ سے محفوظ رہتے ہیں اور فصلوں کی پیداواری کوالٹی اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔

سطحیات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ	وقت استعمال
500 لیٹر فی 100 ہیکٹر پانی	پہلا اہرے مکمل آگاہی، دوسرا اہرے پھلنے کے 45 دن بعد (آلو بیٹے پر)



مائیکٹو ایکسٹرا

مائیکٹو ایکسٹرا وسیع دائرہ اثر والا جدید ہر ہے جو کسی اور کسی طریقہ اثر کی بدولت سنڈیوں کے جسم سے کیلشیم آئینز کے بہاؤ کو متاثر کر کے پھولوں کی حرکت کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے۔ اور سنڈیوں کی بیرونی جلد کا نین کو بننے سے روک دیتا ہے جس کی وجہ سے نقصان دہ کیڑے سست اور مفلوج ہو کر خوراک لینا بند کر دیتے ہیں اور بلا آخر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔



میتولا گولڈ 960 کی

میتولا گولڈ جڑی بوٹیوں کی نئی کوئیوں پتوں اور جڑوں کے ذریعے جذب ہو کر اثر انداز ہوتا ہے۔ جس سے ڈیلا، اسٹسٹ، سوانگی اور دیگر جڑی بوٹیوں کا اگنے سے پہلے خاتمہ ہو جاتا ہے۔

سطحیات برائے استعمال

زمین کی حالت	مقدار فی ایکڑ
گلی سر اور پانی ہیرا	800 لیٹر
مبارکی ہیر اور پانی زمین	800 لیٹر
پانی زمین	800 لیٹر




فرٹی ہیومو

فرٹی ہیومو زمین میں نامیاتی مادے کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ جس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔

سطحیات برائے استعمال

مقدار استعمال	وقت استعمال
8 ٹن/ہیکٹر فی ایکڑ	زمین کی تیاری کے وقت استعمال کریں



فرٹی کے 50

فرٹی کے 50 پانی میں حل پذیر کھاد ہے جس میں پوناش کے علاوہ سلفر کی اضافی مقدار بھی موجود ہے۔ پودے کی افزائش، طاقت اور پیداوار کے لیے ضروری ہے۔ فرٹی کے 50 کے استعمال سے فصل کی پیداوار کو بالائی اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔

سطحیات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ	وقت استعمال
100 لیٹر پانی	جب فصل 60 دن کی ہو پہلا اہرے کریں اور 15 دن کے وقفے سے دوسرا اہرے کریں
2 ٹن/ہیکٹر	

زنگرین

زنگرین پودے میں زنک اور سلفر کی کمی پوری کرتا ہے۔ زنگرین دانے دار ہونے کی وجہ سے چھلکے کرنے میں انتہائی آسان ہے۔

سفارشات برائے استعمال

مقدار استعمال	وقت استعمال
7.5 کلوگرام فی ایکڑ	100 لیٹر پودے نمودار ہونے پر چھلک کریں

فرٹی میکرو

فرٹی میکرو پودوں میں ضروری خوردگی اجزاء کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ فرٹی میکرو 100 فیصد پانی میں حل پذیر ہے اور پتوں کے ذریعے با آسانی جذب ہو جاتا ہے۔

سفارشات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ 100 لیٹر پانی	وقت استعمال
1 سے 2 کلوگرام	پودوں کے مکمل آگے 10 دن بعد اس پر سے کریں اور 15 دن کے وقفے سے حسب ضرورت دہرائیں

پینڈ پینٹ

پینڈ پینٹ ایک وسیع الاثر زہر ہے جو چوڑے پتے اور گھاس نما خاندان کی جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔



میکسل

میکسل دو پھپھوندی کش زہروں پر مشتمل منفرد کیما ہے۔ میکسل پودے کی سطح پر تہہ بنا کر پھپھوندی کے نظام تنفس کو متاثر کرتا ہے۔ جس سے پھپھوندی کے سپورز کا اگاؤ رک جاتا ہے۔ اور سرایت پذیری کی وجہ سے پھپھوندی کی بڑھوتری اور افزائش نسل رکنے سے بیماریوں کا پھیلاؤ ناممکن ہو جاتا ہے۔

سفارشات برائے استعمال

تیاریاں	شرح استعمال
ایکڑا اور مچھلکا	250 گرام فی ایکڑ


نوٹائل

72 فیصد پانی

نوٹائل ایک ایسا منفرد پھپھوندی کش زہر ہے جو بیماریوں کے خلاف تیزی سے اثر کرتا ہے اور پھپھوندی کے سپورز کو ختم کر کے بیماریوں پر بہترین کنٹرول فراہم کرتا ہے۔

سفارشات برائے استعمال

تیاریاں	شرح استعمال
مچھلکا (Late Blight)	600 گرام فی ایکڑ



ریکاڈوا ایکسٹرا

60 فیصد پانی

ریکاڈوا ایکسٹرا ایک نہایت منفرد اور مؤثر پھپھوندی کش زہر ہے جو پھپھوندی اجسام میں توانائی بننے کے عمل کو روک کر بیماریوں پر مکمل کنٹرول فراہم کرتا ہے۔

ایزوسٹار

18.7 فیصد پانی

ایزوسٹار دو مختلف مالکیولز پر مشتمل ایک طاقتور اور جدید کیما ہے جو کہ حفاظتی اور معالجاتی طریقہ اثر سے بیماریوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایزوسٹار فنجائی کے عمل تنفس کو روک کر بیماریوں پر مکمل کنٹرول فراہم کرتا ہے۔



اولالا

50 فیصد پانی

اولالا سفید مکھی اور کالا تیل (ایفڈ) آلہ کی فصل پر حملہ آور ہو کر پتوں اور تنوں سے رس چوسنا شروع کر دیتے ہیں جس سے فصل کمزور ہو جاتی ہے اور پودے کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ یہ کیڑے فصل پر داس کے پھیلاؤ کا سبب بھی بنتے ہیں۔

سفارشات برائے استعمال

کیڑے	مقدار فی ایکڑ
رس چوسنے والے کیڑے	60 گرام



کاک پیٹ

کاک پیٹ قدرتی اجزاء پر مشتمل ایک بائیو اسٹیمولیٹ ہے جو کہ پودوں میں جڑ، تنے، شاخوں کی بڑھوتری اور نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کاک پیٹ پودے کے اندر خوراک کے بہاؤ اور ساخت میں بہتری کے علاوہ غیر حیاتیاتی دباؤ کے خلاف تحفظ اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ کاک پیٹ کے اسپرے سے پھولوں اور پھلوں کی مقدار بڑھنے سے پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔

