

مرج کی منافع بخش اور معیاری پیداوار کیلئے کراپ نیچمنٹ پروگرام



فرٹی ہیوما

فرٹی ہیوما زمین میں نامیاتی مادے کی پوری کرتا ہے جس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے

سفارشات برائے استعمال

مقدار استعمال	وقت استعمال
8 کلوگرام فی ایکڑ	دوسری کھادوں کے ساتھ ملا کر



مینٹولا گولڈ

مینٹولا گولڈ جڑی بوٹیوں کی نئی کونپلوں، تنوں اور جڑوں کے ذریعے جذب ہو کر اثر انداز ہوتا ہے جس سے ڈیلا، اٹسٹ، سواکی اور دیگر جڑی بوٹیوں کا اگنے سے پہلے ہی خاتمہ ہو جاتا ہے

سفارشات برائے استعمال

زمین کی حالت	مقدار فی ایکڑ
ہلکی حیرا، درمیانی حیرا	800 ملی لیٹر
بھاری حیرا اور ریتلی زمین	800 ملی لیٹر
چکنی زمین	800 ملی لیٹر



پینڈینٹ

پینڈینٹ ایک وسیع الاثر زہر ہے جو چوڑے پتے اور گھاس نما خاندان کی جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کرتا ہے

سفارشات برائے استعمال

جڑی بوٹی	مقدار فی ایکڑ
اٹسٹ، پاتھو، کرکٹ، چولائی، کلفا، ملی بوٹی، سواکی گھاس	1 تا 1 1/2 لیٹر فی ایکڑ



زنگرین

زنگرین پودے میں زنک اور سلفر کی کمی پوری کرتا ہے۔ زنگرین دانے دار ہونے کی وجہ سے چھلنے کرنے میں انتہائی آسان ہے

سفارشات برائے استعمال

مقدار استعمال	وقت استعمال
3 کلوگرام فی ایکڑ	پھول آنے سے پہلے پھلنے کریں



فرٹی میکرو

فرٹی میکرو پودوں میں ضروری خوراک کی اجزاء کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔

فرٹی میکرو 100 فیصد پانی میں حل پذیر ہے اور پتوں کے ذریعے با آسانی جذب ہو جاتا ہے

سفارشات برائے استعمال

مقدار استعمال	وقت استعمال
2 کلوگرام (فی 100 لیٹر پانی میں)	پہلا اسپرے پھول آنے سے پہلے کریں 20 سے 30 دن کے وقفے سے دوسرا اور تیسرا اسپرے کریں



سلفوم

سلفوم ایک وسیع الاثر پھپھوندی کش زہر ہے سلفوم پودوں میں سلفر کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے سلفوم کی پودوں پر چکنے کی صلاحیت کے وجہ سے بارش میں اس کا اثر زائل نہیں ہوتا بہترین نتائج کے لیے سلفوم کو بیماری کی علامات نمودار ہونے سے پہلے استعمال کریں۔



ڈوم ٹریکس

ڈوم ٹریکس ایک وسیع دائرہ عمل والا کیڑے مارز ہر ہے جو سفید مکھی اور دوسرے رس چوسنے والے کیڑوں پر خشکی یا نظام تنفس کے ذریعے داخل ہو کر اندرونی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے کیڑے سست پڑ جاتے ہیں اور رس چوسنا چھوڑ دیتے ہیں۔

ڈوم ٹریکس ایک مؤثر اور دیر پا کنٹرول فراہم کرنے والا بہترین کیسیا ہے



سفارشات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ	کیڑا
200 ملی لیٹر	سفید مکھی، ایفڈ، سست تیلہ، جونکین

ڈیکوڈ

ڈیکوڈ لمسی اور خشکی طریقہ اثر سے کیڑوں کا خاتمہ یقینی بناتا ہے

ڈیکوڈ رس چوسنے والے کیڑوں اور سنڈ یوں میں بننے والی توانائی کو روک کر پٹھوں کو کمزور کر کے کیڑوں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔



اولالا

اولالا کے ایک ہی اسپرے سے سفید مکھی اور تیلے کا خاتمہ

اولالا کی منفرد ڈی ایف فارمولیشن سے لمبے عرصے کا کنٹرول

اولالا کا بارش کے بعد بھی اثر برقرار

اولالا کی پتوں میں آر پار جذب ہونے کی صلاحیت سے چھپے ہوئے کیڑوں کا یقینی خاتمہ

سفارشات برائے استعمال

مقدار فی ایکڑ	کیڑا
80-56 گرام	سفید مکھی، ایفڈ



مائیکٹو ایکسٹرا

مائیکٹو ایکسٹرا وسیع دائرہ اثر والا جدید زہر ہے جو کسی اور خشکی طریقہ اثر کی بدولت سنڈ یوں کے جسم سے کیشیم آئینہ کے بہاؤ کو متاثر کر کے پٹھوں کی حرکت کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے۔ اور سنڈ یوں کی بیرونی جلد کا نشن کو بننے سے روک دیتا ہے جس کی وجہ سے نقصان دہ کیڑے سست اور مفلوج ہو کر خوراک لینا بند کر دیتے ہیں اور بلا آخر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔



فرٹی کے 50

فرٹی کے 50 پانی میں حل پذیر کھاد ہے جس میں پوٹاش کے علاوہ سلفر کی اضافی مقدار بھی موجود ہے جو پودے کی افزائش، طاقت اور پیداوار کے لئے ضروری ہے

فرٹی کے 50 کے استعمال سے فصل کی پیداواری کوالٹی اور وزن میں بھی اضافہ ہوتا ہے

سفارشات برائے استعمال

مقدار استعمال	وقت استعمال
2 کلو گرام	پھل بننے کے بعد اسپرے کریں اور 15 دن کے وقفے سے دہرائیں



مائیکٹو فوڈ

مائیکٹو فوڈ منفرد زہروں پر مشتمل ایک جدید کمپسٹری ہے۔ جو کہ سفید مکھی (بالغ اور بچے) اور دوسرے رس چوسنے والے کیڑوں کے نظام تنفس اور آروائے آر (RYR) کے غیر منظم ایکٹیویشن (Activation) کے ذریعے کیڑوں کا مؤثر خاتمہ کرتا ہے۔

اسپرے کے فوراً بعد ہی کیڑوں کے خوراک لینے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ یہ زہر پتوں کے آر پار (Translaminar) جذب ہونے کی صلاحیت ہونے کی وجہ سے چھپے ہوئے کیڑوں پر دیر پا اور مکمل کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ دوہرے طریقہ اثر کی بنا پر اس زہر کے خلاف کیڑوں میں قوت مدافعت پیدا نہیں ہوتی اور یہ سفید مکھی کی ان نسلوں پر بھی بہت مؤثر ہے، جو عام زہروں سے کنٹرول نہیں ہوتیں۔



میکسل

میکسل دو پھپھوندی گش زہروں پر مشتمل منفرد کیسیا ہے

میکسل پودے کی سطح پر تہہ بنا کر پھپھوندی کے نظام تنفس کو متاثر کرتا ہے جس سے پھپھوندی کے سپورز کا اگاؤ رُک جاتا ہے اور سرانیت پذیر کی کی وجہ سے پھپھوندی کی بڑھوتری اور افزائش نسل رکنے سے بیمار یوں کا پھیلاؤ ناممکن ہو جاتا ہے

سفارشات برائے استعمال

بیماری	مقدار فی ایکڑ	وقت استعمال
نوخیز پودوں کا مہر جھاؤ/ کالراٹ	200-250 گرام فی 100 لیٹر پانی	بیماری نمودار ہوتے ہی
جڑ کا گلاؤ	500 گرام	اسپرے کریں



کی کورائٹسٹریز لمیٹڈ، انگری سائنسز

63-مرنگ روڈ، لاہور۔ ہیلپ لائن: 0800-73337

